

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR DE INDEPENDENCE ESTUDIANTES / PERSONAL CON EXAMEN DE MIEMBRO DEL HOGAR PARA COVID-19

Updated October 20

El estudiante / miembro del personal no debe regresar a la escuela / trabajo si un miembro del hogar está esperando los resultados de la prueba COVID-19.

Resultados de la prueba COVID-19 para miembros del mismo hogar

Positivo



Si un estudiante / miembro del personal está expuesto a un caso positivo de COVID-19, el estudiante / miembro del personal debe permanecer en casa para la evaluación y debe considerar la posibilidad de realizar la prueba.



Negativo



El estudiante / miembro del personal puede regresar a la escuela después de trabajar con la enfermera escolar en su escuela.

¿El estudiante / miembro del personal presenta síntomas de COVID-19? (fiebre, tos, falta de aire / dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta o pérdida del gusto u olfato)

SI



El estudiante / miembro del personal no debe regresar a la escuela hasta que hayan trabajado con la enfermera de la escuela. La enfermera puede aprobar que los estudiantes / personal regresen si:

- Han pasado 10 días * desde que apareció el primer síntoma Y
- El estudiante / miembro del personal no tiene fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Los síntomas también deberían mejorar.

Los estudiantes / miembros del personal que exhiban síntomas de COVID-19 y un resultado negativo en la prueba deben seguir las mismas pautas que un caso positivo antes de regresar a la escuela / trabajo.

NO



El estudiante / miembro del personal no debe regresar a la escuela durante 14 días desde la última exposición. ** Si el contacto continúa durante el período de aislamiento del caso positivo de COVID-19, el estudiante / miembro del personal no debe regresar hasta 14 días después de que el caso positivo haya desaparecido aislamiento Y al trabajar con la enfermera de la escuela.

* Las personas que están hospitalizadas por COVID-19 y / o están gravemente inmunodeprimidas pueden justificar un período de aislamiento de hasta 20 días después de la aparición del primer síntoma.